

PFLEGEANLEITUNG

Die nachfolgende Pflege **3-4x** täglich durchführen!

1. Hände gründlich waschen und mit einem Taschentuch trocknen
2. Die gepiercte Stelle mit **OCTENISEPT** oder **PRONTOLIND** besprühen und 30 Sekunden einwirken lassen
3. Falls eingetrocknetes Wundsekret vorhanden, bitte mit einem sauberen Taschentuch vorsichtig vom Piercing weg wischen

WÄHREND DER VERHEILZEIT:

- _ Den Piercingschmuck nicht entfernen
- _ Keine Wattestäbchen oder Wattepad verwenden
- _ Das Piercing nicht mit ungewaschenen Händen berühren
- _ Keinen Druck bzw. Zug ausüben & nicht darauf schlafen
ACHTUNG: Dadurch entsteht die hypertrophe Narbenbildung
- _ Das frische Piercing nur mit gewaschenen Händen berühren
- _ Kein Tauchen, kein Dampfbad/Sauna/Therme für 4 Wochen
- _ Keine Alkohol- und Drogenexzesse, schone dein Immunsystem!
- _ Bitte vor dem Sport duschen und keinen Sport treiben, der direkten Kontakt mit Böden oder Geräten bedeutet
- _ Keine anderen Pflegemittel als die oben Erwähnten verwenden
- _ Keine Salben, Öle, Cremes, Duschgels oder Make-Up auf oder in der Nähe des Piercings verwenden
- _ Während der Verheilzeit keine Haare schneiden bzw. färben
- _ Keine zu engen oder fussligen Kopfbedeckungen tragen

BEFOLGE DIE ANWEISUNGEN UND DEIN PIERCING SOLLTE PROBLEMLOS VERHEILEN, WENN DENNOCH PROBLEME AUFTRETEN MELDE DICH JEDERZEIT ZUERST BEI MIR!

BEI BILDUNG EINER HYPERTROPHEN NARBE SCHICK MIR AM BESTEN GLEICH EIN BILD VIA INSTAGRAM ODER MAIL

BRUST & BAUCHNABEL:

- _ Das Pflaster frühestens nach 4 Stunden und spätestens nach 12 Stunden entfernen, danach mit der Pflege beginnen
- _ Pflaster nur bei potentiellm Hängenbleiben verwenden

LIPPE & ZUNGE:

- _ Nach jeder Mahlzeit gründlich mit Wasser spülen
- _ Keine zu heißen oder stark gewürzten Speisen und Getränke
- _ Keine rohen Lebensmittel, wie Sushi, Beef Tatar... (4 Wochen)
- _ Während der 5-10 tägigen Schwellung das Rauchen reduzieren und keinen Alkohol trinken
- _ Kein scharfes Mundwasser oder Granulatzahnpasten
- _ Fremde Körperflüssigkeiten können zu Entzündungen führen:
Achtung beim Küssen und Oralverkehr

INTIM:

- _ Fremde Körperflüssigkeiten können zu Entzündungen führen
- _ Reibung kann zur hypertrophen Narbenbildung führen

	ABHEILZEIT	KONTROLLE	HYPERTROPHIEGEFAHR
BRUST	2-4 Monate	nach Bedarf	3/10
CONCH	4-10 Monate	6 Wochen	6/10
DAITH	3-12 Monate	nach Bedarf	5/10
FORWARD HELIX	2-4 Monate	4-6 Wochen	5/10
HELIX	8-12 Monate	6 Wochen	9/10
INDUSTRIAL	8-12 Monate	nach Bedarf	10/10
LOBE	4-8 Wochen	nach Bedarf	3/10
LIPPE	4-12 Wochen	10-31 Tage	3/10
NOSTRIL	4-10 Monate	6 Wochen	7/10
ROOK	3-8 Monate	6 Wochen	5/10
SEPTUM	4-12 Wochen	nach Bedarf	3/10
SMILEY	4 Wochen	nach Bedarf	1/10
SNUG	3-10 Monate	6 Wochen	5/10
TRAGUS	3-10 Monate	6 Wochen	5/10
ZUNGE	4 Wochen	10-14 Tage	2/10
ZUNGENBAND	4 Wochen	nach Bedarf	1/10

schmuckes maedchen | +43 664 1236115 | facebook: Schmuckes Maedchen
instagram: schmuckesmaedchen | schmuckesmaedchen@mariascharl.com
Maria Scharl, Burggasse 98, 1070 Wien

----- Notfall -----
AKH Tel.: 404 00-19640